



Reunión de países de América Latina y el Caribe de habla hispana sobre Información Estratégica del VIH

APLICANDO DATOS E INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA ACELERAR LA RESPUESTA AL VIH
Panamá, 5 al 7 de abril de 2016


Argentina

Cascada del continuo de atención del VIH
Vinculación y retención

Mag. Ariel Adaszko

Primer pilar

Población de VIH







Sistema de Salud y sistemas de información en Argentina

- Fragmentario
- 3 subsectores
- Subsidios cruzados
- Sistemas de información no integrados
- Escaza información de sectores no públicos

Distribución de nuevos casos de VIH según subsectores de salud



Cascada del VIH 2015





Obstáculos para un buen cálculo de los pilares de vinculación y retención

- Fragmentación de los sistemas de salud.
- Solapamiento y subsidios cruzados.
- Sistema de resguardo de identidad de pacientes.
- Falta de adherencia de los prestadores al uso de los sistemas de información.
-



Estudio de cohorte

Diagnóstico Oportuno y Continuidad en la Atención de las Personas con VIH en la Argentina

Objetivo:

Evaluar las condiciones de vinculación y seguimiento y la eficacia de los regímenes de TAR en las personas con diagnóstico reciente de infección por VIH o inicio de primer TAR en Argentina durante 2013-2014.




Metodología

- Estudio de cohorte concurrente con unidad de análisis individual.
- Dos momentos de recolección de datos sobre cada paciente: basal y a los 12 meses calendarios de ingreso al estudio.
- Muestra por conveniencia en base a la distribución jurisdiccional de los nuevos diagnósticos notificados.

El reclutamiento fue en 2014, meses antes del cambio de las guías de tratamiento nacionales

Resultados preliminares


Se incluyeron 682 personas



De los 587 con diagnóstico reciente:

- 41% de los hombres, 29% de las mujeres y 26% de las trans fueron diagnosticados en etapas sintomáticas.
- 33% tenía menos de 200 CD4, 56% menos de 350 CD4, 73% menos de 500 CD4.
- 82% de los incluidos por diagnóstico reciente continuaban en seguimiento al año. **preliminar**
- 4,7% había fallecido al año. De ellos, el 85% tenía menos de un año de diagnóstico al momento de la muerte.

Resultados preliminares



TAR

Entre quienes tienen carga viral detectable:

45%	Problemas de adherencia
17%	Desarrollo de resistencia
4%	Toxicidad

Sólo 70% mantiene retiro regular de medicación.

¡ Muchas gracias !

Dirección de Sida y ETS