

2020 Objetivos para Acelerar la Respuesta y poner fin al Sida

Reducir las nuevas infecciones a menos de 500 000 globalmente para 2020

0.1 Incidencia de infecciones por VIH

Número estimado de nuevas infecciones por VIH por 1.000 de la población no infectada (MDS)

Reducir la muertes relacionadas al Sida a menos de 500 000 globalmente para 2020

0.2 Mortalidad relacionada al Sida

Número estimado de muertes relacionadas al Sida por cada 100 000 de la población

Eliminar el estigma y discriminación relacionada al VIH para 2020

0.3 Actitudes discriminatorias hacia las personas viviendo con VIH

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 quienes reportan actitudes discriminatorias hacia las personas viviendo con VIH

COMPROMISO 1: Asegurar que las 30 millones de personas viviendo con VIH tienen acceso al tratamiento al alcanzar las metas 90-90-90 para 2020

Comprometerse con el objetivo 90-90-90

Número de personas viviendo con VIH y prevalencia del VIH

Número estimado y porcentaje de personas viviendo con VIH

1.1 Personas viviendo con el VIH que conocen su estado

Porcentaje de personas viviendo con el VIH que conocen su estado, incluyendo datos de la notificación de casos de vigilancia

1.2 Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica

Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente terapia antiretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH.

1.3 Retención en la terapia antirretrovírica 12 meses después de comenzar el tratamiento

Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que continúan con el tratamiento 12 meses después de empezar la terapia antirretrovírica

1.4 Supresión de la carga viral

Porcentaje de adultos y niños viviendo con VIH con supresión virológica en el periodo de notificación (2016)

1.5 Diagnósticos tardíos del VIH

Porcentaje de personas seropositivas con recuento inicial de células CD4 inferior a 200 células/ μ L e inferior a 350 células/ μ L en el periodo de notificación (2016)

1.6 Desabastecimientos de medicamentos antirretrovíricos

Porcentaje de centros donde se produjeron desabastecimientos de uno o más medicamentos Antiretrovirales durante un periodo definido

Responder a las regulaciones, políticas y prácticas que previenen el acceso a medicamentos antiretrovirales seguros, eficaces y asequibles, diagnósticos y tecnologías relacionadas a la salud, incluyendo asegurar el uso completo del Acuerdo sobre los Aspectos del Trato comercial relacionado a las flexibilidades de los derechos de las propiedades intelectuales (TRIPS) y fortalecer la capacidad regional y local para desarrollar, fabricar y entregar productos de calidad asegurada relacionados a la salud. (ICPN con preguntas sobre políticas del OMS rescatadas)

Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)

COMPROMISO 2: Eliminar nuevas infecciones del VIH en niños para 2020 y asegurar que 1.6 millones de niños tienen acceso al tratamiento para el VIH para 2018

Nuevas infecciones del VIH en niños

Número estimado de nuevas infecciones en niños

Tratamiento del VIH en niños: terapia antiretroviral

Número de niños actualmente recibiendo terapia antiretroviral entre todos los niños viviendo con VIH (extraído del indicador 1.2)

2.1 Diagnóstico infantil precoz

Porcentaje de niños que nacen de madres seropositivas que son sometidos a una prueba virológica del VIH durante sus dos primeros meses de vida

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH

Porcentaje estimado madres seropositivas de infecciones por el VIH en niños que nacieron en los últimos 12 meses de madres seropositivas

2.3 Prevención de la Transmisión maternoinfantil del VIH

Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibieron medicamentos antiretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil

2.4 Pruebas de sífilis positiva en mujeres embarazadas que reciben tratamiento en los centros de atención prenatal

Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con resultado positivo para la sífilis y tratadas

COMPROMISO 3: Garantizar el acceso a las opciones de la prevención combinada, incluyendo el profilaxis pre-exposición, la circuncisión masculina medica y voluntaria, la reducción de daños y condones, para al menos 90% de las personas, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países de alta prevalencia y poblaciones clave de hombres gay y otros hombres que

tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, los y las profesionales del sexo y sus clientes, usuarios de drogas inyectables y privados de libertad

Asegurar que 90% de las personas en riesgo de contraer la infección del VIH tienen acceso a servicios de prevención del VIH comprehensiva, incluyendo los y las profesionales del sexo y sus clientes, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, usuarias de drogas inyectables y privados de libertad

Estimaciones sobre el tamaño de las poblaciones clave

Estimaciones sobre el tamaño de trabajadoras/es sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas inyectables, personas transgénero y privados de libertad (reclusos y detenidos)

3.1 Prevalencia del VIH en las poblaciones clave

Porcentaje de la población clave que vive con el VIH

- 3.1a Prevalencia del VIH en los profesionales del sexo
- 3.1b Prevalencia del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- 3.1c Prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas inyectables
- 3.1d Prevalencia del VIH entre personas transgénero
- 3.1e Prevalencia del VIH entre los reclusos y detenidos

3.2 Conocimiento del estado serológico entre las poblaciones clave

Porcentaje de personas de una población clave que vive con el VIH y conoce su estado

- 3.2a Conocimiento del estado entre las y los profesionales del sexo
- 3.2b Conocimiento del estado entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- 3.2c Conocimiento del estado entre los usuarios de droga inyectable
- 3.2d Conocimiento del estado entre las personas transgénero

3.3 Cobertura del TARV entre las poblaciones clave

Porcentaje de la población clave en terapia antirretroviral

- 3.3a Cobertura del TARV entre las y los profesionales del sexo
- 3.3b Cobertura del TARV entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- 3.3c Cobertura del TARV entre usuarios de droga inyectable
- 3.3d Cobertura del TARV entre personas transgénero
- 3.3e Cobertura del TARV entre los reclusos y detenidos

3.4 Uso del preservativo entre las poblaciones clave

Porcentaje de las poblaciones clave que reportan uso del preservativo con su pareja o cliente más reciente

- 3.4a Uso del preservativo entre las y los profesionales del sexo
- 3.4b Uso del preservativo entre los hombres que tienen relaciones con hombres
- 3.4c Uso del preservativo entre los usuarios de droga inyectable
- 3.4d Uso del preservativo entre las personas transgénero

3.5 Cobertura del programa de prevención entre las poblaciones clave (*bajo construcción*)

- 3.5a Los y las profesionales del sexo que recibieron servicios de prevención combinada
- 3.5b Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron servicios de prevención combinada
- 3.5c Los usuarios de droga inyectable que recibieron servicios de prevención combinada
- 3.5d Las personas transgénero que recibieron servicios de prevención combinada

Usuarios de droga inyectable

3.6 Prácticas de inyección segura

Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que declara haber usado un equipo de inyección estéril la última vez que se inyectó

3.7 Agujas y jeringas distribuidas por usuario de droga inyectable

Número de agujas y jeringas que distribuyen los programas de agujas y jeringas por usuario de drogas inyectables por año

3.8 Cobertura de la terapia de sustitución de opiáceos

Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos

Profesionales del sexo

3.9 Profesionales del sexo con sífilis activo

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activo

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

3.10 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con sífilis activo

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con sífilis activo

Privados de libertad (bajo discusión)

3.11 Programas de prevención en cárceles

Alcanzar a 3 millones de personas con la profilaxis pre-exposición para 2020

3.12 Número que inician el PrEP

Número de personas que reciben PrEP por primera vez este año calendario

Alcanzar a 25 millones de hombres con la circuncisión masculina médica y voluntaria en países de alta incidencia para 2020¹

3.13 Número de circuncisiones masculinas voluntarias anuales

Número de hombres circuncidados conforme a estándares nacionales durante los últimos 12 meses

3.14 Prevalencia de la circuncisión masculina

Porcentaje de hombres 15–49 que están circuncidados

Hacer 20 mil millones de preservativos disponibles anualmente para el año 2020 en los países de ingresos bajos y medianos

3.15 Uso del preservativo durante la última relación sexual con una pareja no habitual (nuevo... Múltiples parejas a pareja no habitual)

Porcentaje de hombres y mujeres de 15-49 que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses con una pareja no matrimonial, pareja que no cohabitante que uso un preservativo durante su última relación sexual con esta pareja

3.16 Preservativos distribuidos por persona que vende sexo (nuevo)

COMPROMISO 4: Eliminar las desigualdades de género y poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas, personas viviendo con VIH y poblaciones clave 2020

Garantizar el acceso universal a servicios de salud y atención en sexual y reproductiva de calidad y asequibles, incluyendo servicios de VIH, para mujeres

4.1 Porcentaje de la demanda no satisfecha con los métodos modernos

4.2 Prevalencia de la violencia reciente por parte de la pareja íntima

Proporción de mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que alguna vez estuvieron casadas o tuvieron pareja, y que experimentaron violencia física o sexual por parte de una pareja íntima de sexo masculino en los últimos 12 meses

Porcentaje de países que reportan datos desagregados por género (producto analítico con la herramienta GAM)

¹ Estos dos indicadores solo se requieren de 16 países con alta prevalencia de VIH, bajo niveles de circuncisión masculina y epidemias heterosexuales generalizadas.

4.3 Retraso o evitación de la prueba del VIH, servicios de prevención o tratamiento por estigma o discriminación percibida o experimentada entre las poblaciones clave (*encuestas con población clave*)

Porcentaje de la población clave que reporta un retraso o evitación de la prueba de VIH, servicios de prevención o tratamiento por el estigma o discriminación percibida o experimentadas

- 4.3a Estigma o discriminación percibida o experimentada entre los profesionales del sexo
- 4.3b Estigma o discriminación percibida o experimentada entre los hombres que tienen relaciones con hombres
- 4.3c Estigma o discriminación percibida o experimentada entre los usuarios de droga inyectable
- 4.3d Estigma o discriminación percibida o experimentada entre las personas transgénero

Eliminar el estigma y discriminación relacionado al VIH en lugares de servicios de salud para 2020

4.4 Personas viviendo con el VIH que han experimentado discriminación recientemente en los servicios de salud

Porcentaje de personas viviendo con VIH que han experimentado discriminación en los servicios de salud

Revisar y reformar las leyes que refuerzan el estigma y discriminación, incluyendo la edad de consentimiento, la no-divulgación del estado serológico, exposición y transmisión, restricciones de viaje y prueba mandataria

El Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)

COMPROMISO 5: Garantizar que el 90% de las personas jóvenes tienen las habilidades, el conocimiento y la capacidad para protegerse del VIH y tienen acceso a la servicios de salud sexual y reproductiva para 2020, a fin de reducir el número de nuevas infecciones entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100 000 por año

Nuevas infecciones del VIH en mujeres jóvenes de 15-24 años

Número estimado de nuevas infecciones en mujeres jóvenes de 15-24 años

5.1 Personas jóvenes: Conocimiento sobre la prevención del VIH

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 15 a 24 años que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH

COMPROMISO 6: Garantizar que el 75% de las personas que viven con, en riesgo de y afectados por el VIH obtengan beneficio de la protección social sensible al VIH para 2020

Indicadores para ser incluidos en el GAM 2018

El Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)

COMPROMISO 7: Garantizar que al menos 30% de todos la entrega de servicios es liderado por la comunidad para 2020

Indicadores para ser incluidos en el GAM 2018

El Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)

COMPROMISO 8: Garantizar que las inversiones en VIH aumenten a US\$ 26 mil millones para 2020, incluyendo un cuarto para la prevención del VIH y 6% para los facilitadores sociales

8.1 Gasto relativo al sida

Gasto nacional e internacional relativo al sida por categorías y fuentes de financiación

- 8.1a Gasto en la prueba y consejería del VIH
- 8.1b Gasto en la terapia antiretroviral
- 8.1c Gasto en el monitoreo de laboratorio específico para el VIH
- 8.1d Gasto en TB/VIH
- 8.1e Gasto en la prevención combinada efectiva
- 8.1f Gasto en la prevención de la transmisión de madre a hijo (PTMI)
- 8.1g Gasto en los facilitadores sociales
- 8.1h Gasto en la transferencia de dinero en efectivo para mujeres jóvenes y niñas

COMPROMISO 9: Empoderar a las personas viviendo con, en riesgo de y afectados por el VIH conocer sus derechos y para obtener acceso a la justicia y servicios legales para prevenir y desafiar las violaciones de los derechos humanos

El Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)

COMPROMISO 10: Comprometer sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura de la salud universal, incluyendo tratamiento para la tuberculosis, cáncer cervical y la hepatitis B y C

Reducir las muertes relacionadas a la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH por 75% para 2020

Muertes de tuberculosis entre las personas que viven con el VIH

Número estimado de muertes a causa de la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH (dato de la OMS, no es reportado por los países)

10.1 Gestión conjunta del tratamiento de la tuberculosis y el VIH

Porcentaje de casos incidentes de tuberculosis estimados en personas seropositivas que recibieron tratamiento para la tuberculosis y el VIH

10.2 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH con tuberculosis activa

Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antiretroviral o tratamiento previo) durante el periodo de notificación

10.3 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH que iniciaron la terapia preventiva para la tuberculosis

Número de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación

Infecciones de transmisión sexual

10.4 Hombres con secreción uretral

Rate of men reported with urethral discharge (suspected gonorrhea) in the past 12 months
Número de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses

10.5 Gonorrea entre los hombres

Tasa de gonorrea en hombres diagnosticado en laboratorios

Hepatitis B y C

10.6 Pruebas de hepatitis B

Proporción de personas que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas del virus hepatitis B

10.7 Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada

Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada

10.8 Pruebas de hepatitis C

Proporción de personas que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas del virus de hepatitis C (VHC)

10.9 Proporción de personas diagnosticadas con infección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC

Proporción de personas diagnosticadas con infección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC

Cáncer del cérvix

10.10 Tamizaje del cáncer del cérvix entre mujeres viviendo con el VIH

Proporción de mujeres viviendo con el VIH de 30–49 años que reportan haber sido tamizadas para el cáncer del cérvix utilizando alguno de siguientes métodos: inspección visual con ácido acetático/vinagre (AIV), Papanicolaou, prueba del virus del papiloma humano (VPH).

10.11 Vacunación contra el cáncer del cérvix

Número y cobertura de países con la vacunación del VPH en los programas de inmunizaciones nacional