

# Marco de monitoreo de servicios para grupos de población clave

Mónica Alonso González

Elizabeth Rodríguez



Organización Panamericana de la Salud

Reunión Mecanismo de Coordinación Regional VIH MCR,  
29 y 30 de abril en la ciudad de Guatemala.



**OPS**

# Objetivos 2020 de acción acelerada para poner fin a la epidemia de sida para 2030



para el año 2020

**90-90-90**

Tratamiento

**500 000**

Nuevas infecciones entre adultos


**CERO**

Discriminación

## Fuentes

- Global Health Sector Strategy on HIV 2016-2021, OMS; 2016. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05-eng.pdf?sequence=1>

# Nuevas infecciones por el VIH según grupos de población. América Latina, 2017



- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- Trabajadoras sexuales femeninas
- Clientes y parejas sexuales

- Inyectores de drogas
- Mujeres trans
- Población general

## ¿Qué se considera población clave?

*Aquellas personas con un papel clave en la epidemia, debido a comportamientos específicos que presentan mayor riesgo de infección por VIH y contextos legales y sociales que acentúan su vulnerabilidad social y de acceso a servicios.*

- “Identidad” (identidad de género) y “orientación sexual” es DIFERENTE de “comportamiento/PRACTICA sexual”.
- De cara al monitoreo: Nos interesa definir a la población clave por identificadores de riesgo, por lo tanto, **variables de PRACTICAS y NO POR AUTO-IDENTIFICACION de género o orientación sexual**, con la salvedad de **identidad de género para mujeres TRANS.**

# Operativización de variables para población clave

¿Se considera usted: hombre, mujer, trans u otro?

¿Cuál fue su sexo asignado al nacer: sexo masculino, sexo femenino o intersexual?

3. ¿Ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses con...? Marque todas las que apliquen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mujeres       | <input type="checkbox"/> Hombres trans     |
| <input type="checkbox"/> Hombres       | <input type="checkbox"/> Otro              |
| <input type="checkbox"/> Mujeres trans | <input type="checkbox"/> Rechaza contestar |


4. ¿Ha intercambiado sexo por bienes o dinero en los últimos 12 meses?

- |                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Rechaza contestar |
|-----------------------------|-----------------------------|--|

5. ¿En los últimos 12 meses, ha utilizado drogas inyectables?

- |                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Rechaza contestar |
|-----------------------------|-----------------------------|--|

# Cascadas de prevención y atención para la infección por el VIH en población clave



Adaptado de FHI360. HIV cascade framework for key populations; 2015 y ONUSIDA. Talking about HIV with men who have sex with men and with transgender people in Asia. A self-study and reference manual for outreach workers, case workers and other HIV service providers; 2016.

# Servicios VIH/ITS trazadores del paquete básico para grupos de población clave VIH negativa

Servicios basados en derechos humanos, inclusivos y libres de estigma y discriminación

Prueba VIH: Conoce estatus VIH-

Vinculado a servicio de prevención VIH/ITS

En seguimiento a los 12 meses

Se mantiene libre de VIH a los 12 meses

- Prueba de VIH
- Condones y lubricantes
- Tamizaje de sífilis
- Apoyo de pares para vinculación
- Tamizaje VHB
- nPPE

- Valoración del riesgo y elegibilidad PrEP
- Prueba confirmatoria sífilis activa y tratamiento
- Valoración clínica ITS
- Tamizaje Ng/Ct
- Vacunación VHB

- Valoración del riesgo
- En PrEP
- Prueba VIH
- Prueba sífilis
- Valoración clínica ITS
- Tamizaje Ng/Ct

- Prueba VIH

## \*Seguimiento:

usuario PrEP: cada 3 meses

No usuario PrEP: cada 6 meses (TSF) -12 meses (HSH)

**Nota:** No se incluyen los servicios específicos para inyectores de drogas, mujeres trans etc....

Todos los servicios incluidos aquí son recomendaciones de la OMS


# Evaluación del riesgo sustancial de infección por el VIH



## **Riesgo sustancial de infección por VIH si, en los últimos 6 meses:**


- Relaciones sexuales vaginales/anales sin condón con más de una pareja
- ITS
- Uso previo de PPE
- Pareja sexual: con factor riesgo VIH o VIH+
- Uso drogas inyectables

# Monitoreo de servicios trazadores VIH/ITS para población clave



**Notas:** Desglose por tipo población clave, grupo de edad (<29, 29-50, >50)

# Indicadores para el monitoreo de servicios trazadores VIH/ITS para grupos de población clave VIH negativos




## Indicadores de INPUTS


- Condomes distribuidos para PC /Σ de PC
- Lubricante distribuido para PC /Σ de PC
- # centros que proveen PrEP
- # y % de centros que proveen nPPE
- # pruebas autoadministradas distribuidas
- # y % centros con RRHH capacitado en E&D cada 2 años
- % PC reporta E&D en los centros de salud

- % PC VIH- con valoración riesgo
- % PC VIH- con riesgo sustancial /PC VIH- con valoración de riesgo
- % PC tamizado sífilis /año
- % PC tamizado Ng/año
- % PC elegibles que inició PrEP en el último año
- # PC que recibió PEP
- % PC tamizado VHB ultimo año
- % PC vacunados VHB ultimo año
- % PC con sífilis tratados/año
- % en PrEP 3 m. seguidos en el último año

# Ejemplo de cascada de prevención




# Ejemplo de cascada de prevención para HSH, desglose por edad




- Estimacion de PC VIH-
- Tamizado para VIH
- Tamizado y VIH-
- Vinculados a servicios de prevención
- En seguimiento a los 12 meses
- Libre de VIH a los 12 meses

# Indicadores para el monitoreo de servicios trazadores VIH/ITS para grupos de población clave VIH positivos



# Ejemplo de cascada de prevención para HSH, Bolivia



Fuente: programa nacional de VIH/ITS de Bolivia en actividad de Mision

**Motivar a los Jefes de programa a continuar el proceso de Vigilancia de la población clave negativa con miras a la cobertura de prevención combinada:**

**EQUIPO DE OPS/ONUSIDA/FM**

- **ASISTENCIA TECNICA**
- **VISITAS A PAISES**
- **ENLACE CON PROGRAMA DE PREP**
- **GESTION DE NUEVOS APOYOS DE FINANCIACION**

**GRACIAS**

## Marco elaborado por

- **Monica Alonso**
- **Maeve Brito de Melo**
- **Bernardo Nuche**

## Agradecemos aportes de :

- **Giovanni Ravasi**
- **Marcelo Vila**
- **Manuel Da Quinta**
- **Massimo Ghidinelli**
- **Pedro Avedillo**
- **Yannis Mameletzis**
- **Otros compañeros de OPS, ONUSIDA y Fondo Mundial**



AGRADECIMIENTOS